

# LE CAMPAGNOL DES CHAMPS (*Microtus arvalis*)



<b>DENOMINATION</b>	Campagnol des champs
<b>POIDS ADULTE</b>	De 15 à 35g
<b>LONGUEUR TETE+CORPS</b>	De 6 à 10cm
<b>QUEUE</b>	De 2 à 3cm, unicolore
<b>PELAGE</b>	Dos brun, ventre plus clair
<b>OREILLES, OUÏE</b>	Petites et camouflées dans le pelage. Excellente ouïe
<b>YEUX, VUE</b>	Petits mais bien visibles. Vue médiocre
<b>MUSEAU, ODORAT, GOÛT</b>	Obtu. Excellent sens de l'odorat et du goût
<b>CROTTEES</b>	Lisses, cylindriques, plus ou moins regroupées dans des « crottoirs » ou lieux de défécation Longueur : 5mm environ
<b>HABITUDES, HABITAT</b>	Vit dans les friches sans arbres et secondairement dans toutes les cultures, surtout fourragères. Préfère les sols secs. Creuse des galeries peu profondes avec de nombreuses ouvertures béantes reliées en surface par des coulées où il dépose ses crottes Activité crépusculaire
<b>RAYON D'ACTION</b>	Peut se déplacer jusqu'à 60m du nid
<b>REGIME ALIMENTAIRE</b>	Herbivore : racines, jeunes pousses, légumes, graines ou fruits au sol
<b>DUREE DE VIE</b>	De 6 mois à 1 an
<b>MATÛRITE SEXUELLE</b>	1 mois
<b>JEUNES PAR PORTEE</b>	De 4 à 5
<b>PORTEES PAR AN</b>	De 3 à 6
<b>DEGATS MATERIELS</b>	Trous dans les jardins et les champs
<b>RISQUES SANTE ANIMALE et HUMAINE</b>	Abîme et consomme les cultures céréalières et légumières La présence d'importantes populations peut avoir des effets sur les troupeaux : baisse de la qualité du lait, boiteries, problèmes de fertilité. Maladie : salmonellose via les crottes et dans certains cas, leptospirose via l'urine